

# \* مطالعه گرده‌شناختی برخی از گونه‌های ایرانی جنس گل فراموشمکن (*Myosotis*)

بهاره اکبرنژاد: دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ۱۴۹۱۱-۱۵۷۱۹، ایران

فرخ قهرمانی نژاد✉: استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ۱۴۹۱۱-۱۵۷۱۹، ایران (fgh@knu.ac.ir)

محمود بیدارلرد: استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

مهرشید ریاحی: استادیار گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ۱۴۹۱۱-۱۵۷۱۹، ایران

احسان حسینی: محقق انجمن زیست‌شناسی ایران، خیابان کلهر، پلاک ۲۸۵، تهران ۱۳۴۵۶-۶۶۸۵۶

## چکیده

جنس گل فراموشمکن، در بیشتر مناطق معتدل هر دو نیم کره پراکنش داشته و برخی از گونه‌های آن به عنوان گیاه زینتی به کار گرفته می‌شوند. جهت روش نمودن روابط آرایه‌شناسی گونه‌های این جنس، دانه‌های گرده ۱۴ گونه به کمک میکروسکوپ نوری (LM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. سی و یک ویژگی نظیر اندازه گرده‌ها، شکل و ترتیبات سطحی، نوع دریچه و تعداد و اندازه آن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و با کمک نرم‌افزارهای IQ-TREE و Past و درخت‌های تبارشناختی آن ترسیم گردید. در نتیجه مشخص شد که گونه‌های نظیر *M. diminuta* و *M. ramosissima* با *M. minutiflora* و *M. lithospermifolia* ۱ و *M. sparsiflora* مورفیسم در شکل دانه‌های گرده تشخیص داده شد. آنالیز PCA و Clustering صفات گرده‌شناسی در خوشبندی گونه‌های مطالعه شده با یکدیگر منطبق بوده و یکدیگر را تأیید نمود. صفات طول محور قطبی در نمای استوایی با میکروسکوپ نوری، صفت قطر نمای استوایی یا قطبی با میکروسکوپ نوری، نسبت طول محور قطبی به محور استوایی شیارهای کاذب و صفت وجود اجسام متشی موجود در سر قطبی دانه‌های گرده، جهت خوشبندی گروهی از آرایه‌ها در یک خوش بارز با ارزش بوده و همچنین ساختار دانه‌های گرده گونه‌های *M. anomala*, *M. propinqua*, *M. diminuta*, *Myosotis* sp., *M. sparsiflora*, *M. lithospermifolia* ۱ گزارش می‌شود.

واژه‌های کلیدی: آرایه‌شناسی، دانه گرده، درخت تبارشناختی، ریزراحتشی، گاو زبانیان

## Palynological study on a number of Iranian species of *Myosotis*

Bahareh Akbarnejad: MSc Graduate, Plant Systematics, Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran 15719-14911, Iran

Farrokh Ghahremaninejad✉: Prof., Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran 15719-14911, Iran (fgh@knu.ac.ir)

Mahmoud Bidarlard: Research Assistant Prof., Forests and Rangelands and Watershed Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran

Mehrshid Riahi: Assistant Prof., Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran 15719-14911, Iran

Ehsan Hoseini: Researcher, Iranian Biology Society, No. 285, Kalhor Street, Tehran 13456-66856, Iran

## Summary

The genus *Myosotis* (forget-me-not), has a global distribution in most of the temperate regions of both the Northern and Southern hemispheres where a number of its species are used as ornamental plants. To clarify the taxonomic relationships of its species, pollen grains of 14 species were prepared from the T and FAR herbaria and examined utilizing a light microscope (LM) and a scanning electron microscope (SEM). Thirty-one characteristics such as pollen size, shape, surface type and the type, number and size of apertures studied and analyzed by PAST, PCA and IQ-TREE software, and subsequently, phylogenetic trees are drawn. The results indicated that, *M. ramosissima* and *M. diminuta* with *M. lithospermifolia* 1 and *M. sparsiflora* found to be closely related to each other as they were clustered together. Moreover, pollen shape dimorphism was identified in *M. lithospermifolia* 1 and *M. minutiflora* while the results of PCA analysis and clustering on the basis of palynological traits placed these species together. The characteristics of the polar axes length in the equatorial view with a light microscope and diameter of equatorial or polar axes in light microscopy, the relative length of polar axis to equatorial axis of pseudocolpi, and the presence of Ubisch bodies in the polar head of pollen grains have been found to be valuable for the clustering of *M. lithospermifolia*, *M. sparsiflora*, *Myosotis* sp., *M. diminuta*, *M. propinqua*, *M. olympica*, and *M. anomala* pollen grains which were studied here for the first time. The identify key is provided based on examined the pollen grains characters. The non-monad of pollen grains from *Boraginaceae* in the form of the diversity of pollens of *M. lithospermifolia* 1 is also reported for the first time.

**Keywords:** *Boraginaceae*, micromorphology, phylogenetic tree, pollen grain, taxonomy

\* مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده نخست به راهنمایی آقایان دکتر فرخ قهرمانی نژاد و دکتر محمود بیدارلرد ارایه شده به دانشگاه خوارزمی

گاوزبانیان (*Boraginaceae*) دارای حدود ۹۰ جنس و ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ گونه در جهان هستند (Pourghorban *et al.* 2020). جنس گل فراموشمکن (*Myosotis* L.) پراکنش جهانی داشته و در بیشتر مناطق معتدل هر دو نیم کره شمالی و جنوبی می‌روید. گیاهان این آرایه تکنیا، گل‌هایی نمایان می‌سازند که کاربرد زیستی دارند (Akbarnejad 2023). این جنس حدود ۸۰ تا ۱۰۰ گونه را شامل می‌شود (Mabberley 1967, Riedl 1967, Weigend *et al.* 2016). در فلور ایرانیکا (Riedl 1967) و فلور ایران (Khatamsaz 2002) این جنس به دو زیرجنس *Strophiostoma* (Turcz.) Popov و *Myosotis* خود شامل سه سری به نام‌های (.Riedl 1967, Khatamsaz 2002) *Arvenses* Popov و *Silvatica* Popov *Myosotis*

مطالعات گرده‌شناسی، ابزار مناسبی در پژوهش‌های سیستماتیک در بسیاری از تیره‌های گیاهی هستند (Atazadeh *et al.* 2020; Mohsenzadeh *et al.* 2020; Ranjbar *et al.* 2020). گرده در اعضای گاوزبانیان تنوع ریخت‌شناختی بالای دارد و به همین دلیل تیره مذکور یکی از تیره‌های eurypalynous (پرچور-گرده) در نظر گرفته می‌شود (Clarke 1977a). گونه‌های زیادی از این تیره را می‌توان براساس صفات دانه‌های گرده تشخیص داد (Clarke 1977a, Díez & Valdés 1991), بنابراین، از ریخت‌شناختی گرده می‌توان به عنوان یک ابزار طبقه‌بندی با پتانسیل بالا و خاص استفاده نمود (Nowicke & Ridgway 1973, Nowicke & Skvarla 1974, Nowicke & colpori (Apertuer 1986 El Ghazali & Krzywinski 1989, Hargrove & Simpson 2003, Weigend *et al.* 2016) هستند که دریچه‌های کاذب (pseudocolpi) به صورت هتروکلپیت با دو نوع دریچه (Apertuer) واقعی به نام (El Ghazali & Krzywinski 1989, Díez & Valdés 1991). تاکنون مطالعات زیادی درباره گرده این تیره از جمله جنس *Myosotis* در جهان انجام گرفته است (Robertson 1989, Robertson 1992, Robertson & Lloyd 1991, Sahay 1979, Robertson & Lloyd 1993, Robertson & MacNair 1995, Brandon 2001, Meudt 2016, Volkova *et al.* 2017, Bigazzi *et al.* 2006, Roet & Van Wyk 1997, Fukuda & Ikeda 2012, Bigazzi & Selvi 1998, Bou 1968, Marticorena 1968, Clarke 1977a, Díez 1984, Khatamsaz 2001, Diez & Valdés 2012, Nowicke & Skvarla 1974, Attar *et al.* 2018) روندهای تکاملی در کل تیره بسیار ارزشمند بوده (Sahay 1979, Clarke 1979a, Nozzi *et al.* 2022) و داده‌های مهمی را در توصیف گونه‌های جنس *Myosotis* و زمینه‌های دیگر مانند روندهای تکاملی در دوئه کوآترنری در اختیار قرار می‌دهد که برای طبقه‌بندی این جنس مفید است (Grau & Lein 1968, Grau & Schwab 1982, Díez & Valdés 1991). لذا، این تحقیق با هدف انجام یک مطالعه تبارشناختی روی صفات ریز‌ریخت‌شناختی گرده‌های برخی از گونه‌های ایرانی جنس *Myosotis*، از جمله گونه‌هایی که قبلاً مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند به منظور درک بهتر طبقه‌بندی این جنس در تیره موردنظر صورت پذیرفته شده است.

### روش بررسی

مطالعه روی نمونه‌های هرباریومی هرباریوم‌های T دانشگاه خوارزمی (تهران) و FAR دانشگاه خوارزمی (کرج) صورت گرفت (جدول‌های ۱ و ۲). بساک در پرچم هر نمونه به کمک استریومیکروسکوپ مدل NSZ-405 جداسازی و در یک قطره آب مقطر تقسیم و به خوبی تکان داده شدند. برای بررسی نمونه‌ها توسط میکروسکوپ نوری (LM) مدل Carl Zeiss، استولیز گرده‌ها به مدت ۱۰ دقیقه در اسید استیک ۵٪ و شستشو به مدت ۵ دقیقه در آب مقطر انجام شد. سپس نمونه‌ها به مدت ۱ دقیقه در رنگ متیل‌بلو رقیق شده با آب مقطر رنگ‌آمیزی شدند و به وسیله میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ۱.25 X OLE ۱۰۰ مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی دقیق‌تر نمونه‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مدل Hitachi SU3500 (kV ۲۰-۱۵)، نمونه‌های گرده در آزمایشگاه مرکزی SEM دانشگاه شهید بهشتی، تصویربرداری شدند. عکس‌های تهیه شده با میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی نگاره با نرم‌افزار Imagej 1/5v برای بررسی صفاتی مانند طول و قطر دانه‌های گرده در میکروسکوپ نوری و طول و قطر دانه‌های گرده و طول و درجه دریچه و شیار دانه‌های گرده در میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد مطالعه و اندازه‌گیری قرار گرفتند و صفات مورد بررسی پس از کدگزاری، توسط نرم‌افزار Past 4/13v در ابتدا استاندارد گردیده و سپس تحلیل PCA (Principal Components Analysis) و ترسیم درخت آرایه‌شناختی صفات مورد مطالعه (جدول ۳) به روش UPMGA با معیار شباهت Euclidean با ۱۰۰۰ Bootstrap Namber (Bidarlord & Vitek 2020).

شایان ذکر است که برای چهار گونه (Halbritter et al. 2016) *M. sylvatica* Hoffm. (Halbritter et al. 2016) *M. ramosissima* Rochel ex. Schult. 1 و (Halbritter & Heigl 2020) *M. scorpioides* L. (al. 2020) از داده‌های میکروسکوپ الکترونی از سایت <https://www.paldat.org> استفاده گردیده است.

### جدول ۱- گونه‌های استفاده شده در مطالعه گردش‌شناسی میکروسکوپ نوری (LM) همراه با اطلاعات آنها

**Table 1.** Palynological study of the species with the light microscope (LM) along with their related data

No.	Taxon	Herbarium Name	Locality	Collector/Voucher No.
1	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt	T	Ardebil province: Khalkhal, Sardul, 2800 m	M. Bidarlord 24739
2	<i>M. anomala</i> Riedl.	T	Gilan province: Lisar protected area, Subatan, 2200 m	M. Bidarlord 1972
3	<i>M. diminuta</i> Grau	TARI	Zanjan province: 45 km from Zanjan to Dandi, Morassa village, 8 km toward Damerlu peak, near an abandoned mine, 2510 m	M. Mahmoodi 99889
4	<i>Myosotis</i> sp.	T	Gilan province: Talesh	M. Bidarlord 24740
5	<i>M. lithospermifolia</i> 1	T	Gilan province: Lisar protected area	M. Bidarlord 24746
6	<i>M. lithospermifolia</i> (Willd.) Hornem. 2	FAR	Tehran province: Afjeh Zaygan, 2000 m	Unknown collector 18400
7	<i>M. minutiflora</i> Boiss. & Reut.	T	Ardebil province: Khalkhal, Palangah Mt., 2600 m	M. Bidarlord 24741
8	<i>M. olympica</i> Boiss.	T	Ardebil province: Khalkhal, Palangah Mt.	M. Bidarlord 24745
9	<i>M. propinqua</i> Fisch. & C.A.Mey.	T	Mazandaran province: Saris-Samstandeh, near Velashed, 1100 m	H. Bahrami 11060
10	<i>M. ramosissima</i> Rochel ex. Schult. 2	T	Northern Khorasan province: Esfarayen, Saluk National Park, Joz valley, 1472 m	A. Ezazi 4868
11	<i>M. scorpioides</i> L.	T	Gilan province: Lisar protected area, Subatan, 2000 m	M. Bidarlord 24742
12	<i>M. sparsiflora</i> J.C.Mikan ex Pohl.	T	Ardebil province: Khalkhal, Shahroud riverside, 1200 m	M. Bidarlord 24743
13	<i>M. stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	T	Ardebil province: Khalkhal, Aq-Dagh Mt., 2300 m	M. Bidarlord 24744
14	<i>M. sylvatica</i> Hoffm.	T	Gilan province: Lisar protected area, Bakro Dag, 2700 m	M. Bidarlord 1984

## جدول ۲- گونه‌های استفاده شده در مطالعه گرده‌شناسی میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) همراه با اطلاعات آنها

Table 2. Palynological study of the species with the scanning electron microscope (SEM) along with their related data

No.	TAXON	Herbarium Name	Locality	Collector/Voucher No.
1	<i>Myosotis lithospermifolia</i> 1	T	Gilan province: Lisar protected area	M. Bidarlard 27746
2	<i>M. lithospermifolia</i> 2	FAR	Tehran province: Afjeh Zaygan, 2000 m	Unknown collector 18400
3	<i>M. stricta</i>	T	Ardeabil province: Khalkhal, Aq-Dagh Mt., 2300 m	M. Bidarlard 24744
4	<i>M. sparsiflora</i>	T	Ardeabil province: Khalkhal, Shahroud riverside, 1200 m	M. Bidarlard 24743
5	<i>M. minutiflora</i>	T	Ardeabil province: Khalkhal, Palangah Mt.	M. Bidarlard 24741
6	<i>Myosotis</i> . sp.	T	Gilan province: Talesh	M. Bidarlard 24740
7	<i>M. diminuta</i>	TARI	Zanjan province: 45 km from Zanjan to Dandi, Morassa village, 8 km toward Damerlu peak, near an abandoned mine, 2510 m	M. Mahmoodi 99889
8	<i>M. propinqua</i>	T	Mazandaran province: Sari-Semeskandeh near Velashed, 160 m	H. Bahrami 11060
9	<i>M. olympica</i>	T	Ardeabil province: Khalkhal, Palangah Mt.	M. Bidarlard 24745
10	<i>M. anomala</i>	T	Gilan province: Lisar protected area, Subatan, 2200 m	M. Bidarlard 1972

### نتیجه

- بررسی شکل دانه‌های گرده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و میکروسکوپ نزدی (LM) در بررسی تطبیقی گرده برخی از گونه‌های *Myosotis* از نظر واحد گرده، تمامی گونه‌های مورد مطالعه به جز *M. lithospermifolia* 1 که دارای واحدهای گرده مناد (منفرد) و غیرمناد (چندتایی) با تعداد نامعلوم است، سایر گونه‌ها دارای واحد گرده منفرد بودند. دانه‌های گرده به تغییرات ژنتیکی در ژنتوتیپ گامتوفیت و همچنین به تنش‌های محیطی غیرجهش‌زا بسیار حساس بوده به طوری که برای زنده ماندن، میکروسپورها پس از تقسیم میوزی از یکدیگر جدا نشده و به صورت دوتایی و معمولًا چهارتایی (تتراد) به هم متصل باقی می‌مانند (برخلاف الگوی رشد معمول گردها که دیوار کالولوز خود را بعد از میوز به چهار محصول هاپلوبید می‌شکنند و میکروسپورهای منفرد قبل از تبدیل به گرده بالغ جدا می‌شوند) (Mulcahy 1981).

تاكنوون در گاوزبانیان حالت غیرمناد شدن دیده نشده، لذا در بررسی حاضر، حالت غیرمناد و چسبیده شدن گرده‌ها در *M. lithospermifolia* برای نخستین بار گزارش می‌شوند. از نظر خصوصیات و پراکندگی، همه گونه‌ها به جز *M. minutiflora* و *M. lithospermifolia* 1 که تنوع گرده در شکل در آن‌ها دیده می‌شود، سایر گرده‌ها تا حدودی یکسان بودند. کلاس گرده در همه گونه‌ها به صورت شیار منفذ و مناد بود، به جز *M. lithospermifolia* 1 که هم شیار منفذ و غیرمناد با تعداد نامعلوم وجود داشت. از نظر قطبیت، گرده همه گونه‌ها به جز *M. lithospermifolia* 1 و *M. minutiflora* که حالت هتروپولار و ایزوفولار داشتند، مابقی ایزوفولار بودند. از نظر نسبت P/E (محور قطب به استوا) گرده همه گونه‌ها پرولیت بودند، به جز *M. lithospermifolia* 1 و *M. minutiflora* که علاوه بر پرولیت، گرد بودند. گرده‌های *M. olympica* *M. anomala* *M. lithospermifolia* 2 *M. sylvatica* *M. lithospermifolia* 2 و *M. scorpioides* (Mahmoodi et al. 2015) از نظر شکل متنوع و به صورت ساعت شنبی و باسیلی شکل بودند. در *M. lithospermifolia* 1 گرده‌ها به ساعت شنبی شکل و هرمی چهاروجهی بودند، درحالی که در *M. minutiflora* گرده‌ها ساعت شنبی شکل و مثلثی ولی در *M. lithospermifolia* 2 فقط ساعت شنبی شکل بودند. در بررسی دانه‌های گرده از نظر نمای *M. lithospermifolia* 2 و *M. stricta* *M. sparsiflora* *propinqua*

قطبی، همه گونه‌های مورد مطالعه دارای نمای قطبی، حالت دایره‌ای داشتند، به جز *M. minutiflora* و *M. lithospermifolia* ۱ به ترتیب دایره‌ای و T شکل ولی در *M. lithospermifolia* سه‌وجهی و دایره‌ای بود. در بررسی تزیینات شکل سطح گرده توسط میکروسکوپ نوری، همه گونه‌ها صاف بودند (جدول ۳).

- بررسی دانه‌های گرده براساس دریچه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) در بررسی اندازه‌گیری‌های انجام شده سیستم‌های دریچه‌ای، همه گونه‌ها دارای شش هتروکولپیت (دریچه با بیش از یک نوع شیار) بود، اما در دو گونه ۱ *M. lithospermifolia* و *M. minutiflora* به دلیل تنوع در گرده، علاوه بر شش هتروکولپیت، دو مدل دیگر نیز در بررسی تاخوردگی‌ها (گرده خشک) دیده شد و دریچه‌های همه گونه‌ها فرورفته و شیار منفذها دو حالت ektoaperture endoaperture را نشان دادند. تعداد دریچه‌ها در همه گونه‌ها به جز گونه ۱ *M. lithospermifolia* که دارای تنوع گرده‌ای بود، یک نوع دارای سه دریچه، در نوعی تعداد نامشخص و در سایر گونه‌ها سه دریچه وجود داشت. نوع دریچه‌ها در تمامی گونه‌های مورد مطالعه شیار منفذ و از نظر وضعیت دریچه تمامی گونه‌های مورد مطالعه شیار منفذ [دریچه مرکب متتشکل از یک شیار (اکتودیافراگم) همراه با یک دریچه داخلی با اندازه و شکل متغیر] دارای سه شیار منفذی بودند. در بررسی ویژگی‌های دیگر دریچه گرده همه گونه‌ها مارگو، کشیده و هترودیافراگم بودند. نوع شیار سطحی (colpus) در تمامی گونه‌های مورد مطالعه کاذب و تعداد آن‌ها در تمامی گونه‌های مورد مطالعه به جز گونه ۱ *M. lithospermifolia* که دارای تنوع گرده‌ای بود، در یک نوع سه عدد، در نوعی تعداد نامعلوم و در سایر گونه‌ها سه دریچه کاذب وجود داشت (جدول ۳).


- بررسی دانه‌های گرده براساس اندازه با استفاده از میکروسکوپ نوری (LM) در بررسی اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط نرم‌افزار ImageJ، از نظر کوتاهترین محور قطبی در نمای استوایی، بیشترین متعلق به *M. lithospermifolia* با اندازه ۹ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به *M. anomala* و *M. sparsiflora* با اندازه ۴ میکرومتر بود. در اندازه‌گیری طولانی‌ترین محور قطبی در نمای استوایی، بیشترین متعلق به ۲ *M. diminuta* و *M. ramosissima* ۲ *M. lithospermifolia* ۲ با اندازه ۱۰ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به *M. anomala* و *M. sparsiflora* با اندازه ۵ میکرومتر بود. در بررسی کوتاهترین قطر در نمای استوایی یا قطبی، بیشترین متعلق به *M. diminuta* با اندازه ۷ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به *M. sparsiflora* و *M. anomala* با اندازه ۱ میکرومتر و از نظر طولانی‌ترین قطر در نمای استوایی یا قطبی، بزرگ‌ترین متعلق به *M. dimmiuta* با اندازه ۶ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به *M. sylvatica* و *M. alpestris* *M. anomala* *M. propinqua* *M. sparsiflora* با اندازه ۲ میکرومتر بود (جدول ۳).


- بررسی دانه‌های گرده براساس اندازه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) در اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط نرم‌افزار ImageJ، از نظر کوتاهترین محور قطبی در نمای استوایی، بزرگ‌ترین متعلق به *M. ramosissima* ۱ با اندازه ۹/۵ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به *M. sparsiflora* با اندازه ۴/۸۲۴ میکرومتر بود. از نظر طولانی‌ترین محور قطبی در نمای استوایی، بزرگ‌ترین متعلق به ۱ *M. ramosissima* با اندازه ۱۰/۸۰۶ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به *M. lithospermifolia* ۲ با اندازه ۱۵/۵ میکرومتر بود. در اندازه‌گیری کوتاهترین قطر در نمای استوایی یا قطبی، بزرگ‌ترین متعلق به گونه *M. ramosissima* ۱ با اندازه ۶/۲۵۴ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به ۲ *M. lithospermifolia* با اندازه ۲۰/۵۶ میکرومتر بود. در اندازه‌گیری طولانی‌ترین قطر در نمای استوایی یا قطبی، بزرگ‌ترین متعلق به ۱ *M. ramosissima* ۱ با اندازه ۶/۷۴۱ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به *M. sparsiflora* با اندازه ۱/۹۸۵ میکرومتر بود. در بررسی طولانی‌ترین محور قطبی دریچه در نمای استوایی، بزرگ‌ترین متعلق به *M. scorpioides* با اندازه ۸/۱۴۸ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به *M. sparsiflora* با اندازه ۲/۶ میکرومتر بود. در مطالعه طولانی‌ترین قطر دریچه در نمای استوایی یا قطبی، بزرگ‌ترین متعلق به *M. ramosissima* ۲ با اندازه ۳/۵۳۶ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به *M. lithospermifolia* ۲ با اندازه ۹/۹۵۷ میکرومتر بود. در بررسی طولانی‌ترین محور قطبی شیار کاذب در نمای استوایی، بیشترین متعلق به ۱ *M. ramosissima* با اندازه ۹/۸۵۹ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به *M. sparsiflora* با اندازه ۲/۰۰۴ میکرومتر بود. در مطالعه شیار کاذب، طولانی‌ترین قطر در استوا یا نمای قطبی، بزرگ‌ترین متعلق به *M. alpestris* با اندازه ۱/۵۲۸ میکرومتر و کوچک‌ترین متعلق به ۱ *M. sparsiflora* با اندازه ۱۰/۰ میکرومتر بود (جدول ۳).

- بررسی تزیین و ساختار گرده‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)

*M. olympica* *M. anomala* *M. alpestris* *M. scorpioides* ، *M. ramosissima* ۱ *M. sylvatica* در مطالعه تزیین گرده در *M. lithospermifolia* ۲ و *M. stricta* *M. sparsiflora* *M. diminuta* *M. propinqua* *M. sylvatica* ۱ فقط حالت صاف مشاهده گردید. اجسام متشابک ریز در ناحیه قطب گرده در *Lithospermifolia* ۱ و *M. lithospermifoli* ۲ *M. stricta* *M. sparsiflora* *Myosotis* sp. *M. propinqua* *M. olympica* *M. alpestris* *M. scorpioides* *M. diminuta* *M. propinqua* *M. olympica* *M. anomala* *M. ramosissima* ۱ *M. lithospermifolia* ۱ *M. minutiflora* ۲ *M. stricta* *M. sparsiflora* فقط حالت صاف مشاهده گردید (جدول ۳).


شکل گرده‌های موردنظر مطالعه هم در میکروسکوپ الکترونی نگاره و هم در میکروسکوپ نوری در ۱ و *M. lithospermifolia* ۱ به حالت dimorphism بود (شکل ۱، تصاویر ۱، ۲، ۲۰، ۲۲ و شکل ۲ تصاویر ۵ و ۶). وجود ناجور شکلی (*minutiflora* تاکنون در گرده‌های جنس *Myocotis* گزارش نشده، اما وجود این حالت در اندازه گرده‌های سایر جنس‌های گاوزبانیان گزارش شده است. به عنوان نمونه، وجود ناجور شکلی در اندازه گرده‌ها، در *Lithospermum cobrense* Greene، در *Lithospermum cobrense* گزارش شده است (Ganders 1979).  
مثالی از وجود ناجور شکلی در شکل گرده‌ها را می‌توان در روناسیان (Rubiaceae) نیز مشاهده نمود (Baker 1956).






شكل ۱ - دانه گرده تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) جنس *Myosotis* ( SEM ) نگاره ۱-۴ *M. lithospermifolia* ۱ :۱-۴ *M. lithospermifolia* ۲ :۵-۱۰ *M. stricta* :۱۱-۱۴ *M. sparsiflora* :۱۵-۱۸ *M. minutiflora* :۱۹-۲۲ *M. propinqua* :۳۲-۳۴ *M. diminuta* :۲۹-۳۱ *M. anomala* :۳۹-۴۱ *M. olympica* :۳۵-۳۸ (مقیاس = ۵ میکرومتر).

**Fig. 1.** Scanning electron microscope (SEM) micrographs of *Myosotis* pollen grains. 1–4: *M. lithospermifolia* 1, 5–10: *M. lithospermifolia* 2, 11–14: *M. stricta*, 15–18: *M. sparsiflora*, 19–22: *M. minutiflora*, 23–28: *Myosotis* sp., 29–31: *M. diminuta*, 32–34: *M. propinqua*, 35–38: *M. olympica*, 39–41: *M. anomala* (Bar = 5  $\mu$ m).





شکل ۲ - تصاویر میکروسکوپ نوری (LM) گونه‌های *Myosotis* با بزرگنمایی ۱۰۰ برابر. ۱: *M. alpestris*, ۲: *M. anomala*, ۳: *M. diminuta*, ۴: *Myosotis* sp., ۵: *M. lithospermifolia* ۱, ۶: *M. lithospermifolia* ۲, ۷: *M. minutiflora*, ۸: *M. olympica*, ۹: *M. propinqua*, ۱۰: *M. ramosissima* ۲, ۱۱: *M. palustris*, ۱۲: *M. sparsiflora*, ۱۳: *M. stricta*, ۱۴: *M. sylvatica* (مقیاس = ۵۰ میکرومتر).

**Fig. 2.** Pollen grains of *Myosotis* species by light microscope (LM) with 100x. 1: *M. alpestris*, 2: *M. anomala*, 3: *M. diminuta*, 4: *Myosotis* sp., 5: *M. lithospermifolia* 2, 6: *M. lithospermifolia* 1, 7: *M. minutiflora*, 8: *M. olympica*, 9: *M. propinqua*, 10: *M. ramosissima* 2, 11: *M. palustris*, 12: *M. sparsiflora*, 13: *M. stricta*, 14: *M. sylvatica* (Bar = 50 µm).

**جدول ۳** - مقایسه صفات گردههای گونه‌های مطالعه شده با میکروسکوپ نوری (LM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM). صفات: POU (واحد گرده)، APS (سیستم دریچه)، DIU/PEC (واحد پراکنده‌ی ویژگی‌ها)، SPAEV (کوتاه‌ترین محور قطبی در نمای استوایی با میکروسکوپ نوری)، LPAEV (طولانی‌ترین محور قطبی در نمای استوایی با میکروسکوپ نوری)، SDEPV (کوتاه‌ترین قطر در نمای استوایی یا قطبی با میکروسکوپ نوری)، LM (طولانی‌ترین محور قطبی در نمای استوایی با میکروسکوپ نوری)، LDEPV (طولانی‌ترین قطر در نمای استوایی یا قطبی با میکروسکوپ الکترونی نگاره)، SEM (کوتاه‌ترین محور قطبی در نمای استوایی با میکروسکوپ الکترونی نگاره)، SPAEV (طولانی‌ترین محور قطبی در نمای استوایی با میکروسکوپ الکترونی نگاره)، LDEPV (طولانی‌ترین قطر در نمای استوایی یا قطبی با میکروسکوپ الکترونی نگاره)، POC (کلاس گرده)، POL (قطبیت)، P/ER (نسبت P/E)، SHA (شکل)، OPV (طرح کلی در نمای قطبی)، LM (نمودار سطح با میکروسکوپ نوری)، INF (تغییر شکل گرده خشک)، APN (تعداد دریچه)، APC (نوع دریچه)، APT (وضعیت دریچه)، APP (ویژگی‌های دریچه)، SUP (سطح قطبی)، ALPAEV (طولانی‌ترین محور قطبی دریچه در نمای استوایی با میکروسکوپ الکترونی نگاره)، ALDEPV (طولانی‌ترین قطر دریچه در نمای استوایی یا قطبی با میکروسکوپ الکترونی نگاره)، PSN (تعداد دریچه کاذب)، COT (نوع شیار)، PLPAEV (طولانی‌ترین محور قطبی دریچه کاذب در نمای استوایی با میکروسکوپ الکترونی نگاره)، ORN (تزریقات با PLDEPV). (طولانی‌ترین قطر دریچه کاذب در نمای استوایی یا قطبی با میکروسکوپ الکترونی نگاره)، SEM. (تزریقات با میکروسکوپ الکترونی نگاره، UBB (احسام مثلثی، شکاف، موجود د، قطب دانه گ ۵۵).


**Table 3.** Comparison of pollen characteristics of the studied species with light microscope (LM) and scanning electron microscope (SEM). Characteristics: POU=pollen unit, APS=apertural system, DIU/PEC=dispersal unit and peculiarities, SPAEV (LM)=shortest polar axis in equatorial view, LPAEV (LM)=longest polar axis in equatorial view, SDEPV (LM)=shortest diameter in equatorial or polar view, LDEPV (LM)=longest diameter in equatorial or polar view (LM), SPAEV (SEM)=shortest polar axis in equatorial view, LPAEV (SEM)=longest polar axis in equatorial view, SDEPV (SEM)=shortest diameter in equatorial or polar view, LDEPV (SEM)=longest diameter in equatorial or polar view (SEM), POC=pollen class, POL=polarity), P/ER=P/E-ratio, SHA=shape, OPV=outline in polar view, DO (LM)=dominant orientation (LM), INF=infoldings (dry pollen), APN=aperture number, APT=aperture type, ACC=aperture condition, APP=aperture peculiarities, SUP=surface polar, ALPAEV (SEM)=aperture longest polar axis in equatorial view, ALDEPV (SEM)=aperture longest diameter in equatorial or polar view, PSN=psedocolpi No., COT=colpus type, PLPAEV (SEM)=psedocolpi longest polar axis in equatorial view, PLDEPV (SEM)=psedocolpi longest diameter in equatorial or polar view, ORN (SEM)=ornamentation SEM, and UBB=Ubisch bodies.

Taxon	POU-APS	PRO-FC	SPA(LM)- LPAEV (LM) μm	SDEPV (LM)- LDEPV (LM) μm	SPAEV (SEM)- LPAEV (SEM) μm	SDEPV (SEM)- LDEPV (SEM) μm	POC-POL	P/ER-SHA
<i>Myosotis scorpioides</i>	Monad- 6Heterocolpate	Monad	8–9 μm	3–4 μm	6.556– 7.14 μm	2.303– 2.58 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped
<i>M. propinqua</i>	Monad- 6Heterocolpate	Monad	6–7 μm	2–2 μm	5.081– 5.648 μm	2.508– 2.797 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped
<i>M. sparsiflora</i>	Monad- 6Heterocolpate	Monad	4–5 μm	1–2 μm	4.824– 5.747 μm	2.802– 1.985 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped
<i>M. stricta</i>	Monad- 6Heterocolpate	Monad	8–9 μm	3–4 μm	8.05– 8.696 μm	3.88– 4.076 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped
<i>M. lithospermifolia</i> 2	Monad- 6Heterocolpate	Monad	5–6 μm	3–3 μm	4.905– 5.515 μm	2.056– 2.87 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped
<i>M. sylvatica</i>	Monad- 6Heterocolpate	Monad	5–6 μm	2–3 μm	7.296– 7.949 μm	3.704– 4.046 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped/bacilli-shaped
<i>M. ramosissima</i> 1 for SEM and 2 LM	Monad- 6Heterocolpate	Monad	9–10 μm	4–5 μm	9.5– 10.806 μm	6.254– 6.741 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped/bacilli-shaped
<i>M. alpestris</i>	Monad- 6Heterocolpate	Monad	5–6 μm	2–2 μm	6.954– 7.394 μm	3.128– 3.93 μm	Cad-isopolar	Prolate-hourglass- shaped/bacilli-shaped
<i>M. anomala</i>	Monad- 6Heterocolpate	Monad	4–5 μm	1–2 μm	8.224– 8.546 μm	5.246– 5.944 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped/bacilli-shaped
<i>M. olympica</i>	Monad- 6Heterocolpate	Monad	7–7 μm	3–3 μm	6.78– 7.404 μm	3.062– 3.728 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped/bacilli-shaped
<i>M. diminuta</i>	Monad- 6Heterocolpate	Monad	9–0 μm	5–5 μm	9.243– 9.512 μm	6.189– 6.439 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped/bacilli-shaped
<i>Myosotis</i> sp.	Monad- 6Heterocolpate	Monad	6–7 μm	3–3 μm	7.251– 7.689 μm	3.789– 4.29 μm	Corporate/monad- isopolar	Prolate-hourglass- shaped/bacilli-shaped

<i>M. minutiflora</i>	Monad- 6Heterocolpate/ ?	Monad	9–9	3–4	7.173– 8.369	4.249– 4.32	Colporate/monad- heteropolar/isopolar	Prolate/spheroidal- hourglass-shaped/ outline triangular
<i>M. lithospermifolia</i> 1	Monad/ non monad unknown- 6Heterocolpate/ ?	Monad/ non monad diversity	9–10	3–4	7.735/ 5.627– 8.281/ 6.984	4.286/ 4.128– 4.598/ 4.486	Colporate/non monad unknown- heteropolar/isopolar	Prolate/spheroidal- hourglass- shaped/pyramidal tetrahedron

جدول ۳ (ادامه) - مقایسه صفات گرده‌های گونه‌های بررسی شده با میکروسکوپ نوری (LM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)  
**Table 3 (contd).** Comparison of pollen characteristics of the studied species with light microscope (LM) and scanning electron microscope (SEM)


TAXON	OPV- DO (LM)	INF-APN	APT-APC	APP-SUP	ALPAEV (SEM)- ALDEPV (SEM) μm	PSN- COT	PLPAEV (SEM)- PLDEPV (SEM) μm	ORN (SEM)- UBB
<i>Myosotis scorpioides</i>	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-polar area with triangular tenuitas	8.148– 2.787	3- pseudo colpus	8.714– 0.931	Psilate, perforate- present
<i>M. propinqua</i>	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate, perforate	3.074– 1.035	3- pseudo colpus	3.318– 0.195	Psilate, perforate- present
<i>M. sparsiflora</i>	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate, perforate	2.6– 1.072	3- pseudo colpus	2.004– 0.107	Psilate, perforate- present
<i>M. stricta</i>	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate, perforate	5.235– 1.85	3- pseudo colpus	7.144– 0.188	Psilate, perforate- present
<i>M. lithospermifolia</i> 2	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate, perforate	3.05– 0.917	3- pseudo colpus	3.669– 0.253	Psilate, perforate- present
<i>M. sylvatica</i>	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-polar area with triangular tenuita	3.6– 2.21	3- pseudo colpus	5.067– 0.714	Psilate, perforate- present
<i>M. ramosissima</i> 1 for SEM and 2 LM	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate, perforate	6.575– 3.536	3- pseudo colpus	9.859– 0.576	Psilate, perforate- ?
<i>M. alpestris</i>	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-polar area with triangular tenuitas	6.554– 2.237	3- pseudo colpus	7.683– 1.528	Psilate, perforate- present
<i>M. anomala</i>	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate, perforate	4.061– 2.011	3- pseudo colpus	6.001– 0.407	Psilate, perforate- ?
<i>M. olympica</i>	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate, perforate	5.35– 1.407	3- pseudo colpus	5.899– 0.152	Psilate, perforate- present
<i>M. diminuta</i>	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate, perforate	4.264– 1.688	3- pseudo colpus	5.905– 0.84	Psilate, perforate- ?
<i>Myosotis</i> sp.	Circular shape- psilate	Aperture (s) sunken-3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate	3.214– 1.943	3- pseudo colpus	3.832– 0.456	Psilate- present
<i>M. minutiflora</i>	Circular shape/ T-shape- psilate	Aperture (s) sunken-3/ 3	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate	3.119/3– 1.656/ 1.663	3/3- pseudo colpus	6.509/?– 0.302/ ?	Psilate- ?
<i>M. lithospermifolia</i> 1	Circular shape/ trihedral- psilate	Aperture (s) sunken-3/ ?	Colporus- corporate/ tricolporus	Lalongate, margo, pseudocolpus, heteroaperturate-psilate	3.472/?– ?/?	3/?- pseudo colpus	4.851/?– 0.633/ ?	Psilate- present/ ?



شکل ۳- درخت تبارشناختی گونه‌های *Myosotis* توسط صفات بررسی شده در مطالعات میکروسکوپ نوری (LM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) با استفاده از نرم‌افزار Past

**Fig. 3.** Phylogenetic tree of the species of *Myosotis* by traits obtained by light (LM) and scanning electron microscopy (SEM) studies using Past software.

در مطالعه روابط آرایه‌شناختی صفات گرده در گونه‌های جنس *Myosotis* می‌توان گفت که صفات بررسی شده روی گونه‌های مختلف در تحقیق حاضر، در سه خوشة جدا گردید. به این ترتیب که *M. lithospermifolia* 1 و *M. minutiflora* در یک خوشه، *M. olympica* *M. anomala* *M. alpestris* *M. scorpioides* *M. diminuta* و همچنین *M. diminuta* و *ramosissima* در یک خوشه و همچنین *M. lithospermifolia* 2 و *M. stricta* *M. sparsiflora* *Myosotis* sp. *M. propinqua* (تکنیا) مجزا حدبندی شدند. میزان ضریب صحت درخت رسم شده با استفاده از شباهت Euclidean به روش UPGMA ۹۱۱۴ بود که میزان مناسبی درنظر گرفته شد به این صورت که هر چه این عدد به ۱ نزدیک‌تر باشد حاکی از مناسب بودن صفات انتخابی و درست بودن رسم درخت تبارشناختی در بررسی حاضر است. علت تفاوت در قرابت دو لوکالیته *M. lithospermifolia* 1 و *M. lithospermifolia* 2 در درخت تبارشناختی را می‌توان وجود دی‌مورفیسم دانه‌های گرده در لوکالیته استان گیلان این گونه عنوان داشت.



شکل ۴- آنالیز PCA صفات مورد مطالعه (A-B). ۱: *M. sylvatica*, ۲: *M. ramosissima*, ۳: *M. scorpioides*, ۴: *M. alpestris*, ۵: *M. anomala*, ۶: *M. olympica*, ۷: *M. propinqua*, ۸: *M. diminuta*, ۹: *Myosotis* sp., ۱۰: *M. minutiflora*, ۱۱: *M. sparsiflora*, ۱۲: *M. stricta*, ۱۳: *M. lithospermifolia* ۲، ۱۴: *M. lithospermifolia* ۱ (جدول ۴).

**Fig. 4.** PCA analysis of studied traits (A-B). 1: *M. sylvatica*, 2: *M. ramosissima*, 3: *M. scorpioides*, 4: *M. alpestris*, 5: *M. anomala*, 6: *M. olympica*, 7: *M. propinqua*, 8: *M. diminuta*, 9: *Myosotis* sp., 10: *M. minutiflora*, 11: *M. sparsiflora*, 12: *M. stricta*, 13: *M. lithospermifolia* 2, 14: *M. lithospermifolia* 1 (Table 4).

در شکل A، گونه‌ها در سه خوش‌بندی گروه شده‌اند. گونه‌های *M. lithospermifolia* ۱ و *M. minutiflora* در یک خوش‌بندی، گونه‌های *M. anomala*، *M. alpestris*، *M. scorpioides*، *M. diminuta* و *M. ramosissima* در یک خوش‌بندی و همچنان گونه‌های *M. lithospermifolia* ۲ و *M. stricta*، *M. sparsiflora*، *Myosotis* sp.، *M. propinqua* و *M. olympica* تک‌نیا یا مونوفیلیتیک حدبندی شده‌اند، نتیجه خوش‌بندی صفات مطالعه حاضر را تایید نمود.

در شکل ۴B صفت C (واحد پراکندگی و ویژگی‌ها) برای جداسازی گونه *M. minutiflora* (تعداد دریچه‌ها)، P (طرح کلی در نمای قطبی)، Y (تعداد شیارهای کاذب) و ۳۲ (تزمینات دانه‌های گرده با میکروسکوب الکترونی نگاره) برای جداسازی گونه ۱ *M. lithospermifolia* صفت X (بیشترین قطر دریچه در نمای استوایی یا قطبی) برای جداسازی گونه‌های به ترتیب *M. diminuta* و *M. anomala* و *M. alpestris* *M. scorpioides* *ramosissima* دریچه، ۳۱ (طولانی‌ترین قطر در نمای استوایی یا قطبی) و ۳۰ (طولانی‌ترین محور قطبی در نمای استوایی) برای جداسازی *M. diminuta* و *ramosissima* مناسب بودند (جدول ۴).

در بررسی صورت گرفته در خصوص نقش صفات بر جداسازی مناسب آرایه‌های مورد بررسی مشخص گردید که صفات کوتاه‌ترین محور قطبی در نمای استوایی و طولانی‌ترین محور قطبی در نمای استوایی با میکروسکوب نوری *M. stricta* و *M. scorpioides* را در یک *M. propinqua* *M. anomala* *M. sylvatica* و *M. olympica* *M. lithospermifolia* ۲ *M. alpestris* و *M. sparsiflora* خوش‌جدا کرد. همچنین، صفت طولانی‌ترین قطر در نمای استوایی یا قطبی با میکروسکوب نوری توانست *M. sylvestris* و *M. stricta* *M. scorpioides* را در سه خوش‌جدا نماید. صفت طولانی‌ترین محور قطبی در استوایی شیار کاذب، توانست *M. olympica* و *sylvatica* که هر دو متعلق به سری *Silvatica* بودند را در یک خوش‌جدا نماید و صفت وجود اجسام مثلثی موجود در سر قطبی دانه‌های گرده همه گونه‌های مورد مطالعه به جز *M. anomala* و *M. ramosissima* را در یک خوش‌جدا سازد.

#### جدول ۴- کدگذاری صفات مورد مطالعه آنالیز PCA در *Myosotis*

**Table 4.** Coding of traits studied by PCA analysis in *Myosotis*

Characteristic	Code	Characteristic	Code	Characteristic	Code	Characteristic	Code	Characteristic	Code
Pollen unit	A	Apertural System	B	Dispersal unit and peculiarities	C	Shortest polar axis in equatorial view (LM) $\mu\text{m}$	D	Longest polar axis in equatorial view (LM) $\mu\text{m}$	E
Shortest diameter in equatorial or polar view (LM) $\mu\text{m}$	F	Longest diameter in equatorial or polar view (LM) $\mu\text{m}$	G	Shortest polar axis in equatorial view (SEM) $\mu\text{m}$	H	Longest polar axis in equatorial view (SEM) $\mu\text{m}$	I	Shortest diameter in equatorial or polar view (SEM) $\mu\text{m}$	J
Longest diameter in equatorial or polar view (SEM) $\mu\text{m}$	K	Pollen class		Polarity	M	P/E-ratio	N	Shape	O
Outline in polar view	P	Dominant orientation (LM)	Q	Infoldings (dry pollen)	R	Aperture number	S	Aperture type	T
Aperture condition	U	Aperture peculiarities	V	Aperture longest polar axis in equatorial view (SEM) $\mu\text{m}$	W	Aperture longest diameter in equatorial or polar view (SEM) $\mu\text{m}$	X	Psedocolpi number	Y
Colpus type	Z	Psedocolpi longest polar axis in equatorial view (SEM) $\mu\text{m}$	30	Psedocolpi longest diameter in equatorial or polar view (SEM) $\mu\text{m}$	31	Ornamentation (SEM)	32	Ubsisch bodies	33
Surface polar			34						

در بین جنس‌های گاوزبانیان، کوچک‌ترین دانه گرده در *Cryptantha* Lehm. ex G.Don و *Trigonotis* Steven *Myosotis* دیده می‌شود. در این تیره، دانه‌های گرده از نظر شکل ظاهری غالباً پرولیت و دمبلی شکل هستند (Weigend *et al.* 2014). با وجود تنوع بالای دانه‌های گرده در بین گروه‌های مختلف گیاهان این تیره، به نظر می‌رسد که صفات دانه گرده در آرایه‌شناسی حتی در سطوح پایین‌تر نیز مفید باشد (Noroozi *et al.* 2021).

گرده‌های گیاهان مورد مطالعه در تمامی گونه‌ها منفرد، ۶-هتروکولپیت، شیار منفذی، موناد، ایزوپولار، پرولیت، صاف، شیار منفذ/سه شیار منفذی، کشیده، مارگو، با شیار سطحی کاذب، سوراخدار و با دریچه مرکب بودند. در مقابل، ۱ *M. lithospermifolia* و *M. alpestris* *M. anomala* *M. olympica* *M. diminuta* *M. minutiflora* *M. sylvatica* و *M. ramosissima* دارای تنوع شکل گرده‌ای درون گونه‌ای و *M. lithospermifolia* (جمع‌آوری شده از گیلان) برای نخستین بار در گاوزبانیان گزارش شد. اردتمن (Erdtman 1945)، این حالت را در ۴۱ تیره از گیاهان گل‌دار گزارش داده است. باربر (Barber 1942) حالت چسبندگی دانه‌های گرده را به جای حالت دوتایی یا چهارتایی، به صورت پولینی متشكل از صدها دانه گرده در استبرقیان (Asclepiadaceae)، ثعلبیان (Orchidaceae) و کهوریان (Mimosaceae) گزارش داد. نتایج دیز و والدز (Diez & Valdez 1991) روی ریخت‌شناسی گرده قبیله‌های *Boraginaceae*, *Cynoglossaceae* و *Eritrichieae* در شبه‌جزیره ایبری (Iberian Peninsula) بیان داشت که گرده‌های *Myosotis* ها بیضوی تا مستطیلی فشرده و یا غیرفسرده در ناحیه استوایی و در نمای قطبی شش‌ضلعی و نسبت قطب به استوا ساب‌پرولیت به پرپرولیت قابل تشخیص بود که این نتایج در گرده‌های تحقیق حاضر مشاهده نشد. شکل گرده‌های *M. lithospermifolia* توسط خاتمساز (Khatamsaz 2002) ایزوپولار و پرولیت تشخیص داده شده است، در حالی که گرده *M. palustris* مورد مطالعه در اینجا هتروپولار، ایزوپولار، پرولیت و گرد بود. *وُلکا* و *سورووا* (Volka & Severova 2013) طی بررسی‌های خود روی *M. debilis* *M. arrensis* *M. alpestris* (Hargrove & Simpson 2003) نیز از هار داشتند که گونه‌های *M. palustris* یا *M. stricta* *M. secunda* *M. lithospermifolia* *M. persicaria* *M. laxa* *M. lamottiana* *M. discolor* *M. decumbens* *M. sylvatica* و *M. minutiflora* به صورت پرولیت هستند که این حالت در مطالعه حاضر فقط در گونه *M. welwitschii* دیده شد.

با وجود این که گرده‌های گل فراموش‌مکن ایزوپولار هستند (Meudt 2016)، در بررسی حاضر، در ۱ *M. lithospermifolia* و *M. minutiflora* این قاعده برقرار نبود. گرده‌های *Myosotis* نیوزلندي اوبلیت اسپرودیال، گرد یا پرولیت اسپرودیال و به ندرت پرولیت یا اوبلیت در نمای استوایی با انتهای گرد به ندرت مسطح و کروی، چهارضلعی و پنج‌ضلعی در نمای قطبی هستند (Meudt 2016) که با *Myosotis* های ایرانی متفاوت بود. *وُلکوا* و *همکاران* (Volkova *et al.* 2017) دانه گرده *Myosotis scorpioides* را موناد، پرولیت، ایزوپولار و ساعت شنبی شکل در نمای استوایی و دایره‌ایی در نمای قطبی تشخیص دادند که مانند *M. scorpioides* ایرانی بود. *هائو* و *همکاران* (Hao *et al.* 2017)، دانه گرده *M. wumengensis* را در قسمت بیرونی تقریباً صاف و ساعت شنبی شکل تشخیص دادند که مشابه *Myosotis* های در تحقیق حاضر نبود.

ساختار دریچه جنس *Myosotis* در تمام گونه‌های مورد مطالعه به دو صورت درونی و بیرونی دیده شد و شیار سطحی در تمامی گونه‌ها از نوع کاذب بود (El Ghazali & Krzywinski 1989, Díez & Valdés 1991). طبق اظهار هائو و همکاران (2017)، دانه‌های گرده گل فراموش‌مکن همگی به صورت هتروکولپیت هستند. گرده‌های گونه‌های مطالعه شده مطابق با نتایج مطالعه گرده‌های گل‌های فراموش‌مکن نیوزلندي (Meudt 2016)، دانه‌های گرده هتروکولپیت با ۸، ۱۰ یا ۱۲ عدد دریچه بودند که می‌توان دریچه‌ها را به دو قسمت ektoaperture و endoaperture تقسیم نمود. لازم به ذکر است که گاهی، تعداد دریچه‌ها در یک گونه می‌تواند متفاوت باشد، به طوری که دیز و والدز (Diez & Valdez 1991)، تعداد آن‌ها را در گونه‌های *M. minutiflora* و *M. ramosissima* هشت عدد اما در مطالعه حاضر، این تعداد شش عدد تشخیص داده شد (شکل ۱).

هارگرو و سیمپسون (۲۰۰۳)، طی مطالعه خود روی گاوزبانیان بیان داشتند که ساختار دریچه *M. arvensis* *M. alpestris* و *M. sylvatica* *M. stricta* *M. minutiflora* *M. seuunda* *M. ramosissima* *M. laxa* *M. lamottiana* *M. decumbens* *debilis* و *M. welwitschii* از نوع هتروکولپیت و با سه شیار منفذی و سه شیار کاذب قابل تشخیص است که به جز نوع تنوع گرده در *M. lithospermifolia* ۱ که تعداد دریچه نامشخص بود، در باقی نمونه‌های مورد مطالعه به این حالت مشاهده شد (شکل ۱). این در حالی است که تعداد دریچه‌ها در *M. personii* و *M. discolor* چهار تا شش عدد تشخیص داده شده است (Hargrove & Simpson 2003) که با تحقیق حاضر همسوی نداشت.

دانه‌های گرده در گونه *M. scorpioides* زنوكولپیت و هتروکولپیت با سطح اگزین در نمای استوایی صاف و در نمای قطبی سوراخ دار همچنین دانه‌های گرده دارای سه شیار منفذ متناوب با سه دریچه کاذب بود که می‌توان این حالت از صفات گرده را در نتایج ۱۷ و ۲۰۱۷ گویا و همکاران (2013) که روی تکامل هتروکولپیت این گونه انجام گرفته بود نیز ملاحظه نمود.

در تحقیقی که ۱۷ و ۲۰۱۷ در Volka & Severova (2013) روی ساختار هارموگاتی گرده *M. palustris* انجام دادند مشخص گردید که گرده‌ها زنوكولپورات، هتروکولپیت و سطح اگزین در ناحیه استوایی صاف بود که با تحقیق حاضر که هم صاف و هم سوراخ دار بودند، هم خوانی نداشت، در حالی که در داشتن دانه‌های گرده هتروکولپیت با سه شیار و نیز سه دریچه کاذب متناوب و هر دو قطب با نواحی مخلخل مثلثی شکل، با نتایج حاضر مطابقت داشت.

در انتخاب صفات برتر جهت آرایه‌شناسی گونه‌ها، آنالیز PCA می‌تواند مفید باشد (Bidarlord & Vitek 2020). در تحقیق حاضر می‌توان اظهار داشت که صفات تعداد دریچه‌ها، طرح کلی در نمای قطبی، تعداد شیارهای کاذب، تزیینات دانه‌های گرده با میکروسکوپ الکترونی نگاره، بیشترین قطر دریچه در نمای استوایی یا قطبی، طولانی‌ترین محور قطبی در نمای استوایی دریچه، طولانی‌ترین قطر در نمای استوایی یا قطبی دانه گرده و طولانی‌ترین محور قطبی در نمای استوایی دانه گرده در جداسازی گونه‌های جنس مورد مطالعه حائز اهمیت هستند. همچنین، در جنس چشم‌نووس (*Omphalodes Mill.*) عضو دیگری از گاوزبانیان، صفات نوع دانه گرده، شیار منفذی بودن، حداکثر عرض دانه گرده، دریچه کاذب و تزیینات حاشیه با ارزش هستند (Coutinho et al. 2012). صفات قطر قطبی، قطر استوایی، طول و عرض شیارها، میزان پولیمر مخصوصاً اگزین در مطالعه PCA جداسازی گونه‌های جنس آفتتاب پرست متعلق به همین تیره ارزشمند هستند (Yousaf et al. 2022). در مطالعه PCA خواجوبی نسب و همکاران (*Heliotropium Tourn. ex L.*) روی دانه‌های گرده برخی از گونه‌ای ایرانی جنس زنگله‌ای (*Onosma L.*) از تیره مذکور، اشاره نمودند که طول محور قطبی، طول شیار سطحی، طول محور استوایی، شکل دانه گرده، به عوامل مهم ترین صفات جهت جداسازی گونه‌ها در این جنس دارای اهمیت به سزاوی هستند.

در مطالعات صورت گرفته برخی از دانه‌های گرده مربوط به آرایه‌های متعدد گاوزبانیان می‌توان گفت که دانه‌های گرده در گونه‌های *Echium vulgare* L. بیضوی با سه شیار منفذی، *Moltzia petraea* (Tratt.) Griseb. گردد با هشت شیار منفذی و با سطح دهانه دریچه خاردار، *Nonea vesicaria* (L.) Rchb. با هشت شیار منفذی و مشبك که با تغییر تزیینات اگزین به سمت سطح استوایی، *Trigonotis Myosotis* گلابی شکل و با سه شیار منفذی، با *Alkanna hirsutissima* (Bertol.) A.DC. *Eritrichium nanum* (L.) Gaudin شش دریچه (شیارهای ساده و شیار منفذی با دریچه متناوب)، *Cynoglossum creticum Mill.* شش دریچه *Cynoglossum rockii* I.M.Johnst. سه شیار منفذی متناوب و سه دریچه کولپیت، *Solenanthus watieri* Batt. & Maire شش دریچه، *Myosotis azorica* H.C.Watson و مرکب و مركب مشبك شش ساعت شنی شکل، *Myosotis* همانند برخی از گونه‌های مورد مطالعه تحقیق حاضر قابل مشاهده بود (Weigend et al. 2016). در مطالعه دانه‌های گرده هشت جنس از این تیره (*Mattiola Paracaryum* Boiss.) *Solenanthus Cynoglossum* L. Rindera Pall. *Microparacaryum* (Popov ex Riedl) Hilger & Podlech. (Boiss.) Brand *Lindelofia* Lehm. و *Trachelanthus Klotzsch* Ledeb. مشخص شد که شکل دانه‌های گرده غالباً پرولیت، ساب پرولیت، پرولیت گرد و پرپرولیت است که به جز نوع ۱ *M. lithospermifolia* و *M. minutiflora* پرولیت مانند *Myosotis* های مورد مطالعه در تحقیق حاضر بود. تزیینات دانه‌های گرده تمامی هشت جنس فوق، صاف- نقطه‌دار، صاف- سوراخ دار با گرانولهای ریز، نقطه نقطه- ریز شبکه، مشبك و سوراخ دار ولی در گونه‌های *Myosotis* صاف- سوراخ دار و صاف هستند (Attar et al. 2018).

**کلید شناسایی گونه‌های مورد مطالعه *Myosotis* براساس صفات دانه‌های گرده (با استفاده از صفات SEM)**

- ۱-۱- کلاس گرده شیار منفذی، مومند و غیرمومند .....  
*M. lithospermifolia* ۱ .....  
 ۲-۱- کلاس گرده شیار منفذی و مومند .....  
*M. minutiflora* .....  
 ۲-۲- قطبیت دانه گرده ایزوپولار و هتروپولار .....  
 ۳-۲- قطبیت دانه گرده ایزوپولار .....  
*Myosotis* sp. .....  
 ۴-۳- سطح دانه گرده صاف .....  
 ۴-۲- سطح دانه گرده صاف و سوراخدار .....  
 ۵-۴- دانه‌های گرده ساعت شنی و باسیلی شکل .....  
 ۶-۴- دانه‌های گرده ساعت شنی شکل .....  
 ۷-۵- سطح ناحیه قطبی گرده با اجسام مثلثی شکل .....  
 ۸-۵- سطح ناحیه قطبی گرده بدون اجسام مثلثی شکل .....  
 ۹-۶- قطر در نمای استوایی یا قطبی دانه گرده بالای ۳ میکرومتر .....  
 ۱۱-۶- قطر در نمای استوایی یا قطبی دانه گرده زیر ۳ میکرومتر .....  
*M. stricta* .....  
 ۷-۷- محور قطبی در نمای استوایی دریچه بین ۳ تا ۴ میکرومتر .....  
*M. sylvatica* .....  
 ۸-۷- محور قطبی در نمای استوایی دریچه بین ۶ تا ۷ میکرومتر .....  
*M. alpestris* .....  
 ۹-۸- محور قطبی در نمای استوایی شیار کاذب بالای ۸ میکرومتر .....  
*M. ramosissima* .....  
 ۱۰-۸- محور قطبی در نمای استوایی شیار کاذب زیر ۸ میکرومتر .....  
*M. anomala* .....  
 ۱۰-۹- قطر دریچه در نمای استوایی یا قطبی بالای ۲ میکرومتر .....  
 ۱۰-۹- قطر دریچه در نمای استوایی یا سطح بالای ۲ میکرومتر .....  
*M. diminuta* .....  
 ۱۰-۱۰- قطر در نمای استوایی یا قطبی دانه گرده بالای ۵ میکرومتر .....  
*M. olympica* .....  
 ۱۱-۱۱- محور قطبی در نمای استوایی دریچه بالای ۵ میکرومتر .....  
*M. scorpioidis* .....  
 ۱۲-۱۱- محور قطبی در نمای استوایی دریچه زیر ۵ میکرومتر .....  
*M. sparsiflora* .....  
 ۱۲-۱۲- محور قطبی در نمای استوایی شیار کاذب زیر ۳ میکرومتر .....  
 ۱۳-۱۲- محور قطبی در نمای استوایی شیار کاذب بالای ۳ میکرومتر .....  
*M. propinqua* .....  
 ۱۳-۱۳- قطر در نمای استوایی یا قطبی شیار کاذب زیر ۰/۲۲ میکرومتر .....  
*M. lithospermifolia* ۲ .....  
 ۱۳-۲- قطر در نمای استوایی یا قطبی شیار کاذب بالای ۰/۲۲ میکرومتر .....

**سپاسگزاری**

نگارندگان از هریاریوم‌های T دانشگاه خوارزمی (تهران) و FAR دانشگاه خوارزمی (کرج)، از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، از باغ گیاه شناسی ملی ایران، از آزمایشگاه مرکزی SEM دانشگاه شهید بهشتی و از کلیه محققان محترمی که آن‌ها در انجام این پژوهش یاری نمودند، نهایت تشکر و قدردانی خود را ابراز می‌نمایند.

**References**

- Akbarnejad, B. 2023. Taxonomic study of some species of *Myosotis* using morphological and molecular characters. MSc thesis. Kharazmi University. Tehran. 221 pp. (In Persian).
- Attar, F., Esfandani-Bozchaloyi, S., Mirtadzadini, M. & Ullah, F. 2018. Taxonomic identification in the tribe Cynoglosseae (Boraginaceae) using palynological characteristics. Flora 249: 97–110.

- Atazadeh, N., Sheidai, M., Attar, F., Ghahremaninejad, F. & Koohdar, F. 2020. A palynological study of genus *Cousinia* Cass. (Family Asteraceae), sections *Cynaroideae* Bunge and *Platyacantheae* Rech.f. *Grana* 59(6): 428–443.
- Baker, H.G. 1956. Pollen dimorphism in the Rubiaceae. *Evolution* 10(1): 23–31.
- Barber, H.N. 1942. The pollen-grain division in the Orchidaceae. *Journal of Genetics* 43: 97–103.
- Bidlard, M. & Vitek, E. 2020. Palynological study of some species of *Anthemis* genus and its systematic implications. *Rostaniha* 21(2): 278–291.
- Bigazzi, M. & Selvi, F. 1998. Pollen morphology in the Boragineae (Boraginaceae) in relation to the taxonomy of the tribe. *Plant Systematics and Evolution* 213(1–2): 121–151.
- Bigazzi, M., Nardi, E. & Selvi, F. 2006. Palynological contribution to the systematics of *Rindera* and the allied genera *Paracaryum* and *Solenanthus* (Boraginaceae-Cynoglosseae). *Willdenowia* 36(1): 37–46.
- Brandon, A.M. 2001. Breeding systems and rarity in New Zealand *Myosotis*. Ph.D. thesis, Massey University, Manawat\_u, New Zealand.
- Chacón, J., Luebert, F., Hilger, H.H., Ovchinnikova, S., Selvi, F., Cecchi, L. & Weigend, M. 2016. The borage family (Boraginaceae s.str.): A revised infrafamilial classification based on new phylogenetic evidence, with emphasis on the placement of some enigmatic genera. *Taxon* 65(3): 523–546.
- Clarke, G.C.S. 1977a. Boraginaceae. Review of Palaeobotany and Palynology 24(2): A59–A101.
- Clarke, G.C.S. 1977b. Northwest European pollen flora. 10. Boraginaceae. Review of Palaeobotany and Palynology 24: 59–101.
- Coutinho, A.P., Castro, S., Carbajal, R., Ortiz, S. & Serrano, M. 2012. Pollen morphology of the genus *Omphalodes* Mill. (Cynoglosseae, Boraginaceae). *Grana* 51(3): 194–205.
- Díez, M.J. & Valdés, B. 1991. Pollen morphology of the tribes *Littriobieae* and *Cynoglosseae* (Boraginaceae) in the Iberian Peninsula and its taxonomic significance. *Botanical Journal of the Linnean Society* 107(1): 49–66.
- Erdtman, G. 1945. Pollen morphology and plant taxonomy. *Svensk Botanisk Tidskrift* 39: 286–297.
- Fukuda, T. & Ikeda, H. 2012. Palynological analysis and taxonomic position of the genus *Mertensia* (Boraginaceae). *Botany* 90(8): 722–730.
- Ganders, F.R. 1979. Heterostyly in *Lithospermum cobrense* (Boraginaceae). *American Journal of Botany* 66(6): 746–748.
- Grau, J. & Leins, P. 1968. Pollenkortypen und Sektionegliederung der Gattung *Myosotis*. *Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft* 81(3–4): 107–115.
- Grau, J. & Schwab, A. 1982. Mikromerkmale der Blüte zur gliederung der Gattung *Myosotis*. *Mitt. Bot. Miinch* 18: 9–58.
- Halbritter, H. 2016. *Myosotis sylvatica*. In: PalDat - A palynological database.
- Halbritter, H., Auer, W. & Sonnleitner, M. 2020. *Myosotis alpestris*. In: PalDat - A palynological database.
- Halbritter, H. & Heigl, H. 2020. *Myosotis palustris*. In: PalDat - A palynological database.
- Halbritter, H., Svojtka, M., Fabbro, Th. & Zumbrunn, Th. 2016. *Myosotis ramosissima*. In: PalDat - A palynological database.
- Hao, J. C., Liu, Q.R., Gong, Y.X. & Wei, L. 2017. *Myosotis wumengensis* sp. nov. (Boraginaceae) from central Yunnan, southwest China. *Nordic Journal of Botany* 35(3): 257–261.
- Hargrove, L. & Simpson, M.G. 2003. Ultrastructure of heterocolpate pollen in *Cryptantha* (Boraginaceae). *International Journal of Plant Sciences* 164(1): 137–151.

- Khajoei Nasab, F., Nejad Falatoury, A. & Mehrabian, A. 2023. Pollen morphology in Iranian species of *Onosma* (Boraginaceae). *Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology* 157(2): 437–454.
- Khatamsaz, M. 2002. *Myosotis*. Pp. 244–272. In: M. Assadi (chief ed.), *Flora of Iran* 39. Research Institute of Forests and Rangelands. Tehran (In Persian).
- Khatamsaz, M. 2001. Pollen morphology of Iranian Boraginaceae family and its taxonomic significance. *Iranian Journal of Botany* 9(1): 27–40.
- Mabberley, D.J. 2008. *Mabberley's Plant-book: a portable dictionary of plants, their classifications and uses* (ed. 3). Cambridge University Press.
- Mahmoodi, M., Ghahremaninejad, F. & Maassoumi, A.A. 2015. A new record of the genus *Myosotis* (Boraginaceae) for the flora of Iran: Rediscovery of a rare plant. *The Iranian Journal of Botany* 21(1): 43–46.
- Meudt, H.M. 2016. Pollen morphology and its taxonomic utility in the southern hemisphere bracteate-prostrate forget-me-nots (*Myosotis*, Boraginaceae). *New Zealand Journal of Botany* 54(4): 475–497.
- Mohsenzadeh, S., Sheidai, M., Ghahremaninejad, F. & Koohdar, F. 2020. A palynological study of the genus *Plantago* (Plantaginaceae). *Grana* 59(6): 454–465.
- Mulcahy, D.L. 1981. Pollen tetrads in the detection of environmental mutagenesis. *Environmental Health Perspectives* 37: 91–94.
- Noroozi, M., Ghahremaninejad, F., Bogler, D., Witherspoon, J.M., Ryand, G.L., Miller, J.S., Riahi, M. & Cohen, J.I. 2022. Parsing a plethora of pollen: the role of pollen size and shape in the evolution of Boraginaceae. *Cladistics* 38(2): 204–226. Doi: 10.1111/cla.12488.
- Nowicke, J.W. & Miller, J.S. 1990. Pollen morphology of the Cordioideae (Boraginaceae): *Auxemma*, *Cordia*, and *Patagonula*. Pp. 103–121. In: *Morphology, development, and systematic relevance of pollen and spores*. Springer Vienna.
- Nowicke, J.W. & Ridgway, J.E. 1973. Pollen studies in the genus *Cordia* (Boraginaceae). *American Journal of Botany* 60(6): 584–591.
- Nowicke, J.W. & Skvarla, J.J. 1974. A palynological investigation of the genus *Tournefortia* (Boraginaceae). *American Journal of Botany* 61(9): 1021–1036.
- Popov, M.G. 1953. Boraginaceae. Pp. 97–691. In: *Flora USSR* (Shishkin, B.K. & Bobrov, E., eds). Vol. 19. Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, Moskva and Leningrad.
- Pourghorban, Z., Salmaki, Y. & Weigend, M. 2020. Phylogenetic relationships within the subtribe Cynoglossinae (Cynoglossoideae: Boraginaceae): new insights from nuclear and plastid DNA sequence data. *Plant Systematics and Evolution* 306(2): 45.
- Ranjbar, M., Ezazi, A. & Ghahremaninejad, F. 2020. Contribution to the pollen morphology of *Convolvulus* (Convolvulaceae). *Phytotaxa* 439(3): 199–216.
- Retief, E. & Van Wyk, A.E. 1997. Palynology of Southern African Boraginaceae: the genera *Lobostemon*, *Echiostachys* and *Echium*. *Grana* 36(5): 271–278.
- Riedl, H. 1967. *Myosotis*. Pp. 255–266. In: K.H. Rechinger (ed.), *Flora Iranica* 48. Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz.
- Robertson, A.W. & Lloyd, D.G. 1991. Herkogamy, dichogamy and self-pollination in six species of *Myosotis* (Boraginaceae). *Evolutionary Trends in Plants* 5: 53–63.

- Robertson, A.W. & Lloyd, D.G. 1993. Rates of pollen deposition and removal in *Myosotis colensoi*. Functional Ecology 7: 549–559.
- Robertson, A.W. & MacNair, M.R. 1995. The effects of floral display size on pollinator service to individual flowers of *Myosotis* and *Mimulus*. Oikos 72: 106–114. Doi: 10.2307/3546044.
- Robertson, A.W. 1989. Evolution and pollination of New Zealand *Myosotis* (Boraginaceae). Ph.D. thesis, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
- Robertson, A.W. 1992. The relationship between floral display size, pollen carryover and geitonogamy in *Myosotis colensoi* (Kirk) Macbride (Boraginaceae). Biological Journal of the Linnean Society. Linnean Society of London 46: 333–349. Doi:10.1111/j.1095-8312.1992.tb00868.x.
- Sahay, S.K. 1979. Palynotaxonomy of Boraginaceae and some other families of Tubiflorae. Membrane Biology 4(1–2): 117–205.
- Taroda, N. & Gibbs, P.E. 1986. Revision of the Brazilian species of *Cordia* subgenus *Varronia* (Boraginaceae). Notes from the Royal Botanic Garden Edinburgh 44(1) 105–140.
- Yousaf, Z., Zafar, M., Ahmad, M., Sultana, S., Rozina, Ozdemir, F.A. & Abidin, S.Z.U. 2022. Palyno-anatomical microscopic characterization of selected species of Boraginaceae and Fabaceae. Microscopy Research and Technique 85(4): 1332–1354.
- Volkova, O., Severova, E. & Polevova, S. 2017. Development of heterocolpate pollen in *Myosotis scorpioides* L. (Cynoglosseae, Boraginaceae). Grana 56(5): 368–376.
- Volkova, O.A., Severova, E.E. & Polevova, S.V. 2013. Structural basis of harmonogamy: evidence from Boraginaceae pollen. Plant Systematics and Evolution 299: 1769–1779.
- Weigend, M., Selvi, F., Thomas, D.C. & Hilger, H.H. 2016. Boraginaceae. pp. 41–102. In: Flowering plants. Eudicots. Springer, Cham.